

EZACARD 75

COMPOSITION:

Each enteric-coated tablet contains: Acetyl salicylic acid (aspirin) 75 mg.

PROPERTIES:

Aspirin is a potent inhibitor of both prostaglandin synthesis and platelet aggregation. By decreasing platelet aggregation aspirin (Ezcard) will inhibit formation on the arterial side of the circulation where thrombi are formed by platelet aggregation and anticoagulants have little effect. Ezcard is useful for the secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease. It is used to reduce mortality after myocardial infarction and also given following bypass surgery.

Being enteric-coated, Ezcard tablets will not disintegrate or release aspirin in the stomach so gastric irritation side effects usually induced by aspirin are eliminated.

INDICATIONS:

• **Vascular indications:** Ischemic stroke, TIA, acute MI, prevention of recurrent MI, unstable angina pectoris, and chronic stable angina pectoris.

- Reduce the combined risk of death and non-fatal stroke in patients who have had ischemic stroke of transient ischemia of the brain due to fibrin platelet emboli.

- Reduce the risk of vascular mortality in patients with chronic stable angina pectoris.

• **Following Revascularization procedures:** Coronary artery bypass graft, percutaneous transluminal coronary angioplasty and carotid endarterectomy, where there is a pre-existing condition for which aspirin is already indicated.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Gastrointestinal Risk: NSAIDs cause an increased risk of serious gastrointestinal adverse events including inflammation, bleeding, ulceration, and perforation of the stomach or intestines, which can be fatal. These events can occur at any time during use and without warning symptoms. Elderly patients are at greater risk for serious gastrointestinal events.

Precaution should be exercised in cases of asthma, uncontrolled hypertension, pregnancy (impaired platelet function and risk of hemorrhage, delayed onset and increased duration of labour with increased blood loss), avoid in last 3 months of pregnancy; with high doses, closure of fetal ductus arteriosus in utero and possibly persistent pulmonary hypertension and blood coagulation in newborn; kernicterus in jaundiced neonates.

DRUG INTERACTIONS:

- Increased risk of bleeding (due to antiplatelet effect) with anticoagulants.
- Avoid concomitant administration of other NSAIDs (increased side effects).
- Antacids and adsorbents: Excretion increased in alkaline urine; kaolin reduces absorption.
- Effect of phenytoin and valproate is enhanced.
- Increased risk of bleeding with other antiplatelet drugs.
- Corticosteroids: Increased risk of gastro-intestinal bleeding and ulceration; corticosteroids reduce plasma salicylate concentration.
- Cytotoxics: Reduced excretion of methotrexate (increased toxicity).
- Antagonism of diuretic effect of spironolactone; reduced excretion of acetazolamide (risk of toxicity).
- Leukotriene antagonists: Aspirin increases plasma concentration of zafirlukast.
- Metoclopramide enhances effect of aspirin (increased rate of absorption).
- Avoid aspirin until 8–12 days after mifepristone.
- Effect of probenecid and sulfinpyrazone is reduced.

CONTRAINDICATIONS:

- Hypersensitivity to NSAIDs.
- Children under 12 years.
- Breast feeding.
- Peptic ulceration.
- Hemophilia and other bleeding disorders.

SIDE EFFECTS:

Being enteric-coated Ezcard tablets do not cause stomach irritation which is usually induced by aspirin. However, other side effects include bronchospasm, gastro-intestinal hemorrhage (occasionally major), also other hemorrhage (e.g. subconjunctival).

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

The whole tablet is swallowed and should never be crushed or chewed.

- **Secondary prevention of thrombotic cerebrovascular or cardiovascular disease:** 75-300mg daily.

- **Angina:** 75-150 mg daily.

STORAGE:

Store at temperature not exceeding 30 °C.

PACKAGING:

Each box contains 3 strips each of 10 tablets.

Keep All Medicines Out of Reach of Children

Manufactured by: Apex Pharma - S.A.E - Badr City- Egypt.

3025011102

إيزاكارد ٧٥

التركيب:

كل قرص ذو كسوة معوية يحتوي على:

حمض أسيتيل ساليسيليك (أسبرين) ٧٥ مجم.

الخواص:

• يستعمل إيزاكارد كمناع لتجمع وجليط الصفائح الدموية. ولذا فهو يساعد على الوقاية من تكوين الجلطات بالأوعية الدموية. وإيزاكارد مفيد في منع أمراض التجلط بأوعية القلب والمخ وفي خفض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض الجلطات القلبية. كما يستعمل بعد جراحات جويل مسار الأوعية.

وأقراص إيزاكارد ذات كسوة معوية تمنع تفتت الأقراص أو خرب محتواها من الأسبرين في المعدة. وبذلك يمكن تجنب حدوث التهابات بالغشاء المبطن للمعدة.

دواعي الإستعمال:

• الخيلولة دون جمع وجليط الصفائح الدموية. وبالتالي منع تكون الجلطة الدموية.

• الوقاية من مخاطر حدوث السدة القلبية والذبحة.

• الوقاية من حدوث نوبات قلة ورود الدم الوقتية إلى المخ.

الإحتياطات والتحذيرات:

• يجب الإحتياط في حالات الأزمات الربوية. إرتفاع ضغط الدم الخارج عن السيطرة.

• تجنب عدم إستعمال مادة الأسبرين خلال الثلاث شهور الأخيرة من الحمل لإحتمال تسببها في إطالة مدة الوضع مع زيادة النزيف قبل وبعد الولادة وإحتمال تسببها في خلل في عملية التجلط للدم عند الطفل حديث الولادة.

• لا يستخدم كخافض حرارة أو مسكن للألم.

• لا يستخدم للأطفال أقل من ١٢ سنة بغير إشراف طبي.

التفاعلات الدوائية:

• مضادات التجلط تؤدي إلى زيادة مخاطر النزيف.

• يجب تجنب إستعمال العقار مع مضادات الإلتهاب الغير ستيرويدية.

• مضادات الحموضة تؤدي إلى زيادة الإخراج في البول القلوي. كما أن الكاوالين تؤدي إلى تقليل الإمتصاص.

• العقار يؤدي إلى زيادة تأثير فينيتوين وفالبروات.

• الكورتيكوستيرويدات تؤدي إلى زيادة مخاطر النزف وقرح المعدة والأمعاء.

• زيادة السمية نظراً لتقليل إخراج ميثوتريكسات.

• التعارض مع تأثير سيبرونولاكتون من حيث إدرار البول وزيادة السمية نتيجة تقليل إخراج أسيتازولاميد.

• الأسبرين يؤدي إلى زيادة تركيز زافيرولوكاست في البلازما.

• ميتوكلوراميد يسرع من تأثير الأسبرين نتيجة زيادة معدل إمتصاصه.

• يجب تجنب إستعمال الأسبرين لمدة ٨ - ١٢ يوماً بعد ميغيفريستون.

• ينخفض تأثير بروبينيسيد وسلفينبيرازون.

نواهي الإستعمال:

• فرط الحساسية للأسبرين ومضادات الإلتهاب الغير ستيرويدية.

• حالات الرضاعة.

• حالات قرح المعدة والإثنى عشر النشطة.

• حالات النزيف الوعائي وأمراض النزيف الأخرى.

الأعراض الجانبية:

• أقراص إيزاكارد آمنة. حيث أنها مغلفة بكسوة معوية. لذلك فهي لا تسبب تهيج أو إلتهاب الغشاء المبطن للمعدة.

• غير أنه في حالات قليلة قد يحدث تشنج شعبي. نزف بالمعدة أو الأمعاء أو نزف تحت اللثة.

الجرعة وطريقة الإستعمال:

تُبَلع الأقراص مع قليل من الماء دون سحقها أو مضغها.

- الوقاية من أمراض جلطات أوعية القلب والمخ: ٧٥ - ٣٠٠ مجم يومياً.

- الذبحة الصدرية: ٧٥ - ١٥٠ مجم يومياً.

طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠° م.

العبوة:

كل عبوة تحتوي على ثلاثة شرائط بكل منها عشرة أقراص.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

تصنيع: شركة إبيكس فارما - ش.م.م - مدينة بدر - مصر.